



ESAMI DA ESIBIRE PER IL MEZZO DI CONTRASTO PER ESAME TAC

- AZOTEMIA
- GLICEMIA
- CREATININEMIA
- ECG

LA VALIDITA' DEGLI ESAMI E' DI 60 GIORNI
OSSERVARE IL DIGIUNO PER ALMENO 6 ORE
TERAPIA ANTIALLERGICA DA PRATICARE A PAZIENTI A
RISCHIO DI ALLERGIA:

- 1) RANITIDINA CLORIDRATO 150 mg (1 cp mattina e sera)
 - 2) ZIRTEC (1 cp alla sera)
 - 3) Bentelan cp 1 mg (2 cp mattina e sera) (SE NON DIABETICO)
- N.B. In caso di allergia al Bentelan sostituire con Deltacortene 5 mg
(stessa posologia)

La terapia dovrà essere seguita come di seguito specificato:

DUE GIORNI ANTECEDENTI L'ESAME

IL GIORNO DELL'ESECUZIONE DELL'ESAME

DUE GIORNI SUCCESSIVI L'ESECUZIONE DELL'ESAME

Tale terapia va preventivamente sottoposta alla valutazione del proprio
medico curante

ESIBIRE SEMPRE GLI ESAMI PRECEDENTEMENTE ESEGUITI